

и анальгетический эффект поддерживается на протяжении 24 часов.

Суточная доза для взрослых составляет 40 150 мг/24 ч (в три приема). В педиатрии РАПТЕН РАПИД назначают исключительно детям старше 14 лет - 50-100 мг в 2 приема. Препарат принимают перед едой, запивая водой.

Абсолютными противопоказаниями для назначения РАПТЕНА РАПИД являются повышение чувствительности к диклофенаку и язвенная болезнь желудка и/или двенадцатиперстной кишки. При приеме РАПТЕНА РАПИД в редких случаях возможно возникновение головокружения, головной боли, кожных аллергических высыпаний и лекарственных гастропатий. РАПТЕН РАПИД с осторожностью назначают пожилым пациентам, особенно при сердечной недостаточности и нарушении функции почек. При одно-

временном применении РАПТЕНА РАПИД с калийсберегающими диуретиками возможно увеличение уровня калия в крови.

По данным Института ревматологии РАМН, лечение РАПТЕНОМ РАПИД в дозе 150 мг/день в течение 10 дней больных остеоартрозом крупных суставов при наличии сильной и очень сильной боли в суставах привело к отчетливому уменьшению артралгий уже к пятому дню терапии. В конце лечения у части больных боль в суставах отсутствовала, остальные пациенты отмечали минимальные артралгии, что сочеталось с уменьшением или исчезновением симптомов синовита коленных суставов.

Побочные реакции (кожный зуд, головокружение, гастралгии) отмечены в единичных случаях.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Уважаемая редакция!

Известно, что «хондропротекторы», применяемые *per os*, в Европе зарегистрированы как медицинские препараты (Структум, ДОНА и т.п.), а в США - как биологические добавки к пище (Козамин ДС, Хондроитин-комплекс и т.п.).

Есть ли разница по эффективности между этими веществами, если применять их в сопоставимых дозах (например, 1,0-1,5 г. сут хондроитин сульфата)?

С уважением, В.В.Барнацкий

Уважаемый д-р В.В.Барнацкий!

В ответ на Ваше письмо, в котором Вы спрашиваете о различии в эффективности лекарственных препаратов - структума и ДОНА и биологически активных пищевых добавок (БАД) - козамина ДС, хондроитин-комплекса или глюкозамин-хондроитин комплекса сообщаем, что такие хондропротекторы, как структум (фирма «Пьер Фабр») и ДОНА (фирма «Роттафарм») прошли многоцентровые клинические испытания как в России, так и в странах Европы, уже имеется довольно большой опыт успешного их применения при лечении больных остеоартрозом (ОА). В 1 капсуле структума содержится 250 мг хондроитин сульфата натрия, в 1 саше ДОНА-1,5 грамма глюкозамин сульфата.

К применению БАД до сих пор существуют

различные и противоречивые подходы как к регистрации, так и к применению, в том числе и со стороны Food Drug Administration в США. К сожалению, БАД довольно широко используются в клинической практике, но их назначение часто не обосновано и не подтверждено клиническими испытаниями. Это касается и козамина ДС, в состав которого входят: глюкозамин - 500 мг, натрия хондроитин сульфат - 400 мг, аскорбат марганца 66 мг, а также глюкозамин - хондроитин комплекс (в капсуле 757 мг вещества) и т.н. «гибкие суставы» («Joint Flex»), и Инолтра, выпускаемых американскими фирмами. Ни одна из вышеуказанных БАД не проходила клинические испытания в России, поэтому мы не представляем возможным рекомендовать больным необходимые дозы препарата и сроки лечения ими.

Д.м.н. Л.Н. Денисов