


К 50-летию описания болезни Стилла взрослых

В 1897 году Джордж Фредерик Стилл (George Frederick Still), считающийся отцом британской педиатрии, описал особую форму болезни суставов у детей, отличающуюся от ревматоидного артрита у взрослых, проявляющуюся лихорадкой, лимфаденопатией, спленомегалией, полисерозитом.



Джордж Фредерик Стилл (1868–1941)

В 1966 году английский ревматолог Эрик Байуотерс (Eric George Lapthorne Bywaters) в докладе, представленном на Геберденовских чтениях, предложил назвать заболевание, характеризующееся перечисленными выше симптомами, а также характерной кожной сыпью, и развивающееся во взрослом возрасте, болезнью Стилла взрослых.



Эрик Байуотерс (1910–2003)

В 1971 году Э. Байуотерс представил первое развернутое описание 14 пациентов с болезнью Стилла взрослых.

Ann. rheum. Dis. (1971), 30, 121

Still's disease in the adult

E. G. L. BYWATERS

From the Department of Medicine, Royal Postgraduate Medical School, London, and the Medical Research Council Rheumatism Unit, Taplow, Berks.

Статья Э. Байуотерса, посвященная болезни Стилла взрослых, в журнале *Annals of the Rheumatic Diseases*

Интересен профессиональный путь Эрика Байуотерса, который в 1937 году во время работы в Массачусетской больнице (США) проводил исследования, касающиеся системной красной волчанки. В начале Второй мировой войны, вернувшись в Великобританию,

Э. Байуотерс начал работать в знаменитой больнице Хаммерсмит в Лондоне. Во время бомбардировки Лондона он впервые установил, что синдром раздавливания после тяжелой травмы приводит к почечной недостаточности и проявляется высвобождением миоглобина

из поврежденной мышечной ткани. В 1947 году Э. Байуотерс стал директором ревматологической клиники в Мемориальной больнице Канадского Красного Креста, Тапλου (Мэйденхед). Вместе основоположником детской ревматологии Барбарой Анселл (Barbara Mary Ansell) он внес выдающийся вклад в изучение острой ревматической лихорадки, ювенильного хронического артрита у детей и подростков и разработку новых методов лечения, в том числе связанных с применением недавно открытых (Хенч Ф. и соавт.,

1948) глюкокортикоидных гормонов. В 1963 году Э. Байуотерс получил Канадскую международную премию Гэрднера за работу по изучению ревматоидного артрита, а в 1975 году был удостоен титула кавалера Ордена Британской Империи. С 1977 по 1979 годы Э. Байуотерс был президентом Европейской антиревматической лиги (EULAR).

В 1979 году на этом посту его сменила выдающийся российский ревматолог академик В.А. Насонова, первая женщина, избранная президентом EULAR.



ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

1. Bywaters EG. Heberden oration, 1966. Categorization in medicine: A survey of Still's disease. *Ann Rheum Dis.* 1967;26(3):185-193. doi: 10.1136/ard.26.3.185
2. Bywaters EG. Still's disease in the adult. *Ann Rheum Dis.* 1971;30(2):121-133. doi: 10.1136/ard.30.2.121
3. Elkon KB, Hughes GR, Bywaters EG, Ryan PF, Inman RD, Bowley NB, et al. Adult-onset Still's disease. Twenty-year follow-up and further studies of patients with active disease. *Arthritis Rheum.* 1982;25(6):647-654. doi: 10.1002/art.1780250607